

AVES

II deo




Onychorhynchus



Ordo Falconiformes

- Obuhvata oko 300 vrsta, rasprostranjene su po celom svetu.
- Telo im je prilagođeno za hvatanje i ubijanje plena, neke se hrane leševima (dnevne grabljivice).
- Noge su snažne sa jakim kandžama.
- Nadkljuvlje je kukasto i prekriva potkljuvlje
- Kljun prilagođen za raskidanje plena. U osnovi se nalazi voskovica.
- Oči su dobro razvijene, i usmerene napred.
- Voljka je dobro razvijena.



Subordo Cathartae

- Obuhvata **lešinare**, grupisane u familiju **Cathartidae**.
- Žive **samo u Americi**.
- Glava i vrat su **goli**.
- Kandže su male i slabo razvijene.
- Hrane se leševima.



Vultur gryphus – andski kondor



Gymnogyps californianus – kalifornijski kondor

Subordo Serpentarii

- Obuhvata samo **familiju Serpentaridae** sa jednom vrstom ***Sagittarius serpentarius* (sekretar)**.
- Živi po savanama i sličnim staništima **u Africi**.
- **Dugačke noge** služe za ubijanje plena (najčešće zmija).
- Uglavnom hoda u potrazi za plenom, uzleti samo kad je ugrožen.



Subordo Falcones

- Imaju dobro razvijen sirinks.
- Mnoge vrste su ugrožene, pa su zaštićene.
- Obuhvata nekoliko familija:

fam. Vulturidae – krupni su, sa velikim kljunom.
Odlikuje ih redukcija perja na glavi i tupe kandže.



Gyps fulvus – beloglavi sup



Neophron percnopterus – bela kanja

Gyps fulvus



Fam. Accipitridae

- Obuhvata jastrebove, kopce, orlove, mišare, bradana...
- Srednje i velike ptice, predatori ili strvinari.
- Vrlo snažne, sa oštrim kandžama i masivnim kljunom
- Snažne noge služe za ubijanje plena, uglavnom ptica i sisara.
- Mogu da lete vrlo brzo (jastrebovi) ili krstare.



Accipiter gentilis – jastreb kokošar



Accipiter nisus - kobac

fam. Accipitridae – jastrebovi i orlovi



Buteo buteo – mišar



Buteo rufinus – riđi mišar





Aquila chrysaetos – suri (carski) orao



Circus cyaneus – poljska eja



Aquila heliaca – orao krstaš



Gypaetus barbatus – bradan

fam. Falconidae - sokolovi



Falco subbuteo – soko lastavičar

- Najbrži let među pticama.
- U ovoj grupi su i najmanji predatori u okviru Falconiformes.
- Monogamni



Falco tinnunculus – vetruška




Falco peregrinus – sivi soko




Ordo Galliformes

- Oko 280 vrsta, rasprostranjene širom sveta.
- Telo im je **zdepasto** sa kratkim krililma, nisu sposobne za dugačak let.
- Noge su im snažne, prilagođene za **trčanje i čeprkanje** po zemlji.
- Vrat je srednje dužine sa malom glavom. Kljun je kratak i snažan, blago povijen.
- Kod većine je izražen **polni dimorfizam**.
- Gnezda prave na zemlji u koja polažu veći broj jaja.
- Najznačajnije ptice za čoveka.



fam. Phasianidae (Gallidae)

Phasianus colchicus



- Ovoj familiji pripadaju ptice čiji su mužjaci vrlo jarko obojeni (seksualni dimorfizam): fazani, kokoši, paun...
- Imaju kreste i druge ukrase na glavi.
- Slabi letači, snažne noge, kratak kljun, gnezde se na tlu, ptići trčavci.
- Težina od oko 50g do 6 kg, mužjaci veći od ženki.

fam. Phasianidae (Gallidae)



Pavo cristatus



Gallus gallus



Perdix perdix – poljska jarebica

fam. Meleagridae



Meleagris gallopavo



fam. Numidae



Numida meleagris



Acryllium vulturinum

fam. Tetraonidae



***Tetrao urogallus* – veliki tetreb, gluhan**




***Tetrao tetrix* – mali tetreb**



***Lagopus mutus* – snežna koka**

fam. Opisthocomidae *
o. Opisthocomiformes

Opisthocomus hoazin



- Relativno krupne ptice (65 cm dugačka)
- Gnezde se na drveću
- Mladi imaju prste na krilima (atavizam) koji se kasnije gube
- Enigmatska grupa u smislu filogenije




Ordo Gruiformes

- Obuhvata oko 150 vrsta svrstanih u 11 familija.
- Relativno krupne ptice sa izduženim nogama i kljunom.
- Većina je **vezana za vodu**.

Ždralovi- fam. **Gruidae**, imaju **vitko telo** sa dugim vratom.

Odlikuju se ritualnim plesom za vreme udvaranja.
Mužjaci se oglašavaju glasnim krikom.



Grus grus



Grus americana



Grus japonensis

fam. Rallidae – barske koke

- Relativno kratak kljun i kratka zaobljena krila.
- Noge su prilagođene za trčanje ili plivanje.
- Slabi su letači.
- Gnezde se na zemlji među barskim biljkama.



Rallus aquaticus – barski petlovan



Gallinula chloropus – barska koka

fam. Otididae – droplje

- Dugačak i snažan vrat. Noge su izdužene sa po 3 prsta.
- Prilikom udvaranja, naduvavaju gušu i šepure perje.
- Obično se sreću na otvorenim područjim Azije i Afrike.



Otis tarda – velika droplja



Otis tetrix - mala droplja

Ordo Charadriiformes

- Ovde spadaju galebovi, čigre, šljuke, njorke itd.
- Žive pored mora reka i jezera, ishrana im je vezana za vodu.

fam. Laridae – galebovi

- noge prilagođene za plivanje (dobri letači).
- Kljun je blago povijen. Imaju sone žlezde.



Larus ridibundus – rečni galeb



Larus melanocephalus – crnoglavi galeb



***Larus argentatus* – srebrnasti galeb**

Čigre- fam. Sternidae

- uska i dugačka krila, zašiljena na krajevima. Rep je duboko rasečen.
- U letu lilče na laste.
- Široko su rasprostranjene (pored mora, neke pored slatkovodnih basena).



Chlidonias niger – crna čigra



Sterna hirundo – obična čigra



fam. Scolopacidae – šljuke

- imaju kratak i debeo vrat sa kratkom glavom.
- Kljun je dugačak i tanak. Noge su izdužene, prilagođene za gacanje po vodi.



Scolopax rusticola – šumska šljuka



Gallinago gallinago – barska šljuka

Njorke- fam. Alcidae, telo im je izduženo sa kratkim vratom.

Noge su pomerene unazad, sa po 3 prsta spojeni plovnim kožicama.

Krila su kratka- slabi letači, ali dobro rone.

Žive na krajnjem severu, pored obala hladnih mora i okeana.



Alca torda – mala njorka



Uria aalge – obična njorka



Fratercula arctica – morski papagaj, tupik, pufin



Ordo Columbiformes

- Obuhvata golubove i grlilce.
- Imaju kratak vrat i malu glavu sa kratkim kljunom.
- Dobri letači.
- Hrane se zrnevljem (neke plodovima) i imaju dobro razvijenu voljku.
- Od divljeg goluba su izvedene mnoge rase gajenih golubova.
- Recentne vrste pripadaju familiji **Columbidae**.



Columba livia – divlji golub (pećinar)



Columba oenas - dupljaš



Columba palumbus - grivaš



Streptopelia turtur - grlica



Streptopelia decaocto - gugutka




Goura victoria



Ptilinopus magnificus

fam. Raphidae



***Raphus cucullatus* - dodo**

Dodo je ptica koja je živela na Mauricijusu, a istrebljena je krajem 17. veka. Bila je visoka oko 1 m i teška oko 20 kg. Nije letela, pa je zbog toga bila lak plen ljudima i introdukovanim životinjama.

Ordo Psittaciformes

- Papagaji naseljavaju **tropske oblasti**, ali se gaje širom sveta.
- Imaju krupnu glavu sa velikim i **povijenim kljunom**.
- Na nogama su dva prsta okrenuta napred a dva pozadi, pomažu se i kljуном при penjanju.
- Perje je šareno i jarko obojeno.
- Skoro svi su grupisani u familiju **Psittacidae**.



Cacatua galerita



Melopsittacus undulatus



Ara macao



Nymphicus hollandicus



Psittacus erithacus


Ordo Cuculiformes

fam. Cuculidae

- Obuhvata kukavice i turakoe.
- Imaju kratka krila i dugačak rep.
- Dva prsta su okrenuta napred, a dva pozadi.
- Kukavice su široko rasprostranjene, dok turakoi žive samo u podsaharskoj Africi.



Cuculus canorus – evropska kukavica



Clamator glandarius – čubasta (afrička) kukavica



Geococcyx californianus – ptica trkačica



fam. Musophagidae - turakoi



Musophaga violacea



Tauraco erythrolophus

Ordo Strigiformes

- Noćni lovci.
- Kljun i noge prilagođeni za hvatanje i ubijanje plena.
IV prst se suprotstavlja ostalima.
- Perje je mekano i rastresito. (**nečujan let**)
- Oči su okernute napred.
- Oštar vid i sluh.
- Mogu da rotiraju glavu za **270°**.
- **Nemaju voljku**, već su razvijena slepa creva.
- Nesvarene delove hrane izbacuju u obliku **gvalica**.
- Red obuhvata dve familije: **Tytonidae** – kukuvije i **Strigidae**.

fam. Tytonidae



Tyto alba - kukuvija

fam. Strigidae



Bubo bubo – velika ušara, buljina



***Asio otus* – mala ušara**



***Athene noctua* - kukumavka**



Strix aluco – šumska sova



Otus scops - čuk



Nyctea scandiaca – snežna sova



Ordo Caprimulgiformes

- Imaju krupnu glavu i kljun sa **dubokim rascepom**.
- Oko kljuna imaju pera u obliku čekinja koje pomažu pri lovu insekata.
- **Nemaju voljku**. Slepa creva su dobro razvijena.
- Noge su kratke i slabo razvijene.
- Spadaju u dobre letače.
- Aktivne su noću.
- Široko rasprostranjene.

Caprimulgus europaeus
(pomrakuša, leganj)



Ordo Apodiformes

- Obuhvata čiope i kolibrije.
- Najbolje letačice među pticama.
- Imaju dugačka krila i rep.
- Noge su im kratke i slabo razvijene.



Topaza pella



Collocalia sp.

- Čiope delimično liče na laste. (konvergencija)
- Imaju sva 4 prsta okrenuta napred sa kandžama koje služe za kvačenje.
- Kljun im je kratak sa **širokim rascepom**. Hvataju insekte u letu.
- Telo je tamnih boja bez šara.
- Dobro razvijene **pljuvačne žlezde** služe za pravljenje gnezda.

fam. Apodidae

Apus apus



Aerodramus fuciphagus



- Kolibriji su najmanje ptice čiji je areal ograničen na američko područje.
- Perje je šareno i živo obojeno.
- Imaju dugačak i tanak kljun prilagođen za ishranu **nektarom**.



fam. **Trochilidae**



Ordo Coraciiformes

- Ptice različitog oblika i veličine.
- Većina je živo obojena.
- Noge su im kratke, prednji prsti su delimično sraslili pri osnovi.
- Gnezde se u dupljama.
- Red obuhvata više familija čiji se predstavnici razlikuju po habitusu i biologiji.



Coracias garrulus- modrovrana

fam. Coraciidae



Merops apiaster - pčelarica

fam. Meropidae



Alcedo atthis - vodomar

fam. Alcedinidae



fam. Upupidae - pupavci



fam. Bucerotidae
- kljunorošci



Buceros bicornis

Ordo Piciformes



- **Arborealna** grupa ptica. Noge su im prilagođene za **penjanje i hodanje po drveću**. Imaju dva prsta napred i dva pozadi.
- Rep im služi za podupiranje.
- Imaju jak i veliki kljun.
- Gnezde se u šupljinama drveća.
- Većina su rasprostranjene u tropima (sem Australije), dok se detlići sreću i u umerenim područjima.



- Red obuhvata više familija. Kod nas žive predstavnici familije **Picidae**.




Picus viridis – zeleni detlić



Picus canus – sivi detlić




Dryocopus martius – crni detlić



Dendrocopos major – veliki šareni detlić

- Karakteristični i široko poznati su i predstavnici familije **Ramphastidae – tukani**. (Južna Amerika)



Ramphastos toco



Pteroglossus castanotis


Ordo Passeriformes

- Preko 5000 vrsta. **2/3 svih recentnih ptica.**
- rasprostranjene na svim kontinentima (sem Antarktika).
- Na nogama 4 prsta (3 prsta napred, 1 pozadi).
- Kljun je **bez voskovice**.
- Paperje je slabo razvijeno.
- Dele se na 4 podreda:

Eurylaimi, Tyranni, Menurae i Oscines

Subordo Eurylaimi

- Obuhvata ptice koje naseljavaju tropске delove Afrike i Azije.
- Opisano 14 vrsta.
- Telo je **zdepasto**. Imaju širok, pljosnat i povijen kljun pokriven perjem. Hrane se insektima.



Calyptomena viridis

Subordo Tyranni

- Oko 1000 vrsta.
- Naseljavaju Južnu Ameriku.
- Imaju dug i krut rep koji im pomaže pri kretanju po stablima.
- Slabo razvijena muskulatura sirinska.
- Trivijalni naziv - Neotropske puzavice i Muholovke.

fam. Tyrannidae



Onychorhynchus coronatus



Lepidocolaptes angustirostris

fam. Dendrocolaptidae

Subordo Menurae

- Obuhvata 2 familije sa po 2 vrste.
- Rasprostranjene u šumama Australije.
- Familija **Menuridae** – Lirorepe obuhvata 2 vrste.
- Mužjaci imitiraju zvukove.
- Rep u **obliku lire**.



Menura novaehollandiae



- Familija **Atrichornithidae** – Čestarke (pogrmuše).
- Ugrožene!



Atrichornis rufescens



Atrichornis clamosus

Subordo Oscines

- Preko 4000 vrsta grupisanih u oko 40 familija.
- Imaju dobro **razvijen syrinx**. Većina lepo peva, neke gaču (svrake, gavrani, vrane), cvrkuću ili čak imitiraju ljudki govor...
- Imaju raznoliku ishranu (insekti, semenje, plodovi...).
- Mnoge su zastupljene u našoj ornitofauni.



fam. Corvidae - Vrane

- Najkrupniji predstavnici reda.
- Ne pevaju, već gaču ili krešte.
- Kljun je snažan i izdužen.
- Perje je najčešće **tamne boje**, retko ukrašeno.
- Gnezde se na drveću.
- Većina živi u jatima.
- Širok areal rasprostranjenja.



Corvus corax - gavran



Corvus cornix – siva vrana



Corvus frugilegus - gačac




Corvus corone – crna vrana



Corvus monedula - čavka








Garrulus glandarius – sojka, kreja

fam. Sturnidae - čvorci

- Naseljavaju otvorene predele i rubove šuma.
- Većina ima perje koje se **presijava**.
- Žive u jatima.
- Hrane se semenjem, plodovima i insektima. Mogu da nanesu štetu.
- Gnezde se u dupljama drveća i pukotinama stena.
- Imaju karakterističnu **migraciju sever-jug**.




fam. Fringillidae

- Male ptice, širokog rasprostranjenja.
- Dobri pevači.
- Imaju snažan i kratak kljun.
- Hrane se zrnevljem i beskičmenjacima.

Carduelis carduelis

štiglic, češlugar



Fringilla coelebs



Emberiza citrinella – strnadica



Pyrrhula pyrrhula - zimovka



Loxia curvirostra - krstokljun



fam. Ploceidae - vrapci

- Široko rasprostranjeni.
- Imaju kupast kljun.
- Perje žuto i smeđe.

Passer montanus




Passer domesticus



fam. Alaudidae - ševe

- Široko rasprostranjene.
- Na zadnjem prstu imaju dugačku kandžu.
- Hrane se semenjem i raznim beskičmenjacima.
- Gnezde se na zemlji.



Alauda arvensis – poljska ševa



Galerida cristata - ćubasta ševa

fam. Motacillidae

– pliske i trepteljke

- Imaju tanko i vitko telo.
- Dok se kreću po tlu, mrdaju repom gore-dole.
- Česte su pored vodenih tokova.
- Gnezde se na tlu.
- Hrane se insektima.



Anthus trivialis

fam. Paridae - senice

- Imaju kratak i prav kljun.
- Male ptice, široko rasprostranjene.
- Love insekte.
- Gnezde se u dupljama drveća i sličnim mestima.



Parus caeruleus- plava senica

Parus major – velika senica



Parus montanus – planinska senica



fam. Laniidae - svračci

- Imaju snažan i povijen kljun.
- Žive po šumama i stepama.
- Hrane se insektima i drugim sitnim životinjama.
- Široko su rasprostranjene.



Lanius collurio



Lanius excubitor

fam. Muscicapidae

- Obuhvata više potfamilija.

Grmuše- subfam. Sylviinae

- Žive u žbunju i šumama. Dobri su pevači. Rasprostranejne širom Evroazije i Afrike.



Subfam. Turdinae – Drozdovi

- Širokosu rasprostranjeni i brojni.
- Hrane se semenjem i plodovima kao i sitnim beskičmenjacima.



***Turdus merula* - kos**

***Turdus viscivorus* – drozd imelaš**



***Luscinia
megarhynchos* –
slavuj**



Luscinia luscinia

fam. Troglodytidae - cariči

- Imaju **zdepasto** i malo telo, tanak i kratak kljun.
- Krila su zaokrugljena a rep kratak i uspravan.
- Žive po stepama, pustinjama i šumama.
- Ishrana insektima



Troglodytes troglodytes





Cinclus cinclus



fam. Prunellidae- popci
Žive na tlu, na planinskim
liticama i kamenjarima.

fam. Cinclidae- vodenici kosovi

Imaju nepromočivo perje, oči
prilagođene za gledanje u vodi i
nozdrve koje mogu da se zatvaraju.
Žive pored potoka i reka.



Prunella collaris


fam. Hirundinidae - laste

- Imaju **dugačka krila** i spadaju u dobre letačice.
- Kratak kljun, sa velikim rascepom.
- Noge su kratke i slabe.



Hirundo rustica – seoska lasta

Delichon urbica - gradska lasta



Riparia riparia - bregunica

fam. Paradisaeidae

– rajske ptice

- Najlepše ptice, naseljavaju **šume Nove Gvineje** (mali broj u severnoj Australiji).
- **Mužjaci ukrašeni** perjem raznih boja.
- Imaju karakteristična **udvaranja**.



